14. Anafülaksia ja angioödeem

Allergia ja angioödeem (RAVIMID)

* ADRENALIINI MANUSTAMINE:

Lapsed:

Sol Adrenalini 1 mg/ml lahus

6-12a lapsed 0,3 mg IM

Alla 6 a lapsed 0,15 mg IM

Nebulisaatoris:
Sol. Adrenalini 0,5 mg (alla 1a)
1.0 mg (üle 1a)
+ 3 ml NaCl 0.9% + O2 10-12 l/min

Täiskasvanud:
Sol. Adrenalini (lahjendamata)
0,5 mg IM

Nebulisaatoris:
Sol. Adrenalini 1 mg + 2 ml NaCl 0.9% +
O2 10-12 l/min

Adrenaliin IV manustamine:
Perfuusoris:

0.1mikrogrammi/kg/min

PATSIENDI TÄISMONITOORING!
KONSULTEERI ARSTIGA!

*ANTIHISTAMIINIKUMIDE MANUSTAMINE:

Lapsed:

Sol. Tavegyl 0,025 mg/kg IV ad 20 ml

Sol. NaCl 0.9%

Alla 1 - aastastele ei tohi manustada

Täiskasvanud:
Sol. Tavegyl 2 mg IV ad 20 ml NaCl 0,9%

BETA-2-AGONIST MANUSTAMINE:

Lapsed:
Sol. Salbutamol 0.15mg/kg + NaCl 0.9% 2ml
+ O2 10-12 l/min

Täiskasvanud:
Sol. Berodual 1,0 ml + NaCl 0.9% 3-4 ml
Sol. Salbutamol 2,5-5,0 mg + NaCl 0.9% 3-4 ml
+ O2 10-12 l/min

* SÜMPTOMAATILINE RAVI:

Kontaktdermatiit: hoida nahka ärritavate vahendite eest, kasutada lokaalselt rahustavaid nahasalve (käsimüügiravimid);

Vajadusel steroidkreeme ja suukaudseid hormoonpreparaadid (perearst, nahaarst).

Allergilise riniit: glükokortikoidi sisaldav ninasprei ja antihistamiinikumid (perearst);

Allergiline konjuktiviit: mitte hõõruda silmi, jahedad kompressid silmalaugude tursetele, vältida kontaktläätsete kandmist sümptomaatilise perioodi jooksul, vajadusel glükokortikoidid, antihistamiinikumid (perearst, silmaarst);

Kiletiivaliste nõelamised: eemaldada astel, lokaalselt külmakompressid, vajadusel valuvaigistid (MSPVA), glükokortikoidid ühekordse annusena (Prednisolon 1mg/kg), sügelust leevendada suukaudsete antihistamiinikumidega (perearst, käsimüügiravimid).