# 24. Peatrauma




**Punased lipukesed- HOSPITALISEERIDA**

- Suure energiaga tõmptrauma nagu näiteks: Penetreeriv trauma
- Retrograadne amneesia >30 minuti
- Patsient on trauma järgselt oksendanud 2 või enam korda
- Traumajärgne epileptiline hoog
- Kaalutle traumamehhanismi mõju sõltuvalt patisendi vanusest ning kaasuvatest ravimitest ja haigustest
- Kirurgilist sekkumist vajav verejooks või haav
- Oksügenisatsioonihäire, hingamispuudulikkus või vajadus kopsude mehaanilise ventilatsiooni järele
- Mõne muu organsüsteemi häire, mis vajab hospitaliseerimist (nt. šokk, traumajärgne rütmihäire vms)
- Teadvushäirega patsient, GKS<13 vahetult pärast traumat või <15 kaks tundi pärast traumat
- Teadvushäire süvenemine ajas (GKS 2 või rohkem palli)
- Neuroloogiline koldeleid (parees, afaasia) ,Aju pitsumise tunnused
- Koljupõhimiku murru kahtlus, Lahtine või impressioonmurd koljul
- Kontrollimatu valu
- Raske ajutraumaga patsient tuleb hospitaliseerida otse TÜKi või PERHi, vajadusel kutsu vastu reanimobiil. Transpordiga viivitada ei tohi!