26. Sünnitusabi



Sünnituse vastuvõtmine



Nabaväädi prolaps

NABAVÄÄDI PROLAPS

↓

Aseta steriilses kindas 2 sõrme tuppe

↓

Kontrolli nabaväädi pulseerimist

↓

Trendelenburgi asend
• Käpuli asend
(naine toetub põlvedele, puusad õlavöötmest kõrgemal)

↓

Lükka eesasetsev osa (pea, tuhar) ülespoole, et vähendada kompressiooni nabaväädile ja tunned pulseerimist. Hoiad seni kuni oled haiglas

↓

Manusta sünnitajale O2-te (8-10 l/min)

↓

Kiire transport haiglasse! Teavita ette valvegünekoloogi

Tuharseis


TUHARSEIS
Tuharaid ei ole tupepilust näha
Transport haiglasse
Tupest eritub mekooniumi
Tuharad tuhu ajal lahkliha tagant näha
Loode sünnib abaluudeni spont. Toeta tuharaid kergelt, oota järgmist tuhu
Ülemise õla ja käe sünniks suuna loote keha alla, alumise õla ja käe sünniks tõsta loote keha üles
Pea sündimiseks toeta loote keha oma küünarvarre seesmisele pinnale. Vii nimetissõrm lapsele suhu. Suru ettevaatlikult lapse lõug rinnale, teise käega õrnalt õlgadele vajutades. Vabasta pea
Aseta laps ema rinnale, kata soojalt. Klemmi nabaväät kui see lõpetab pulseerimise (~2-10´), lõika läbi

Õlgade düstookia