

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Magneesiumsulfaat, 25%, parenteraalne ravimvorm

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on kasutamiseks ainult haiglattingimustes.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on magneesiumsulfaat ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne magneesiumsulfaadi kasutamist
3. Kuidas magneesiumsulfaati kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas magneesiumsulfaati säilitada
6. Muu teave

1. Mis ravim on magneesiumsulfaat ja milleks seda kasutatakse

Magneesiumsulfaat on kontsentreeritud magneesiumsulfaadi lahus. See ravim kuulub elektritolüütide lahuste hulka. Seda ravimit kasutatakse magneesiumi soolade asendamiseks magneesiumi puuduse korral.

Magneesiumsulfaat on näidustatud südame rütmihäirete ja alkoholi tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete korral.

2. Mida on vaja teada enne magneesiumsulfaadi kasutamist

Ärge kasutage magneesiumsulfaati patsiendil:

- kes on magneesiumsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik enne magneesiumsulfaadi kasutamist:

- kui patsiendil on neerukahjustus. Magneesium eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Seetõttu esineb neerukahjustuse korral magneesiumsulfaadi kasutamisel risk magneesiumi toksikatsiooni tekkeks. Vajalik on ettevaatus. Kasutada tuleb tavapärasest väiksemaid annuseid.
- kui patsiendil on väga raske maksakahjustus.

Magneesiumsulfaadi manustamise ajal tuleb hoolikalt jälgida patsiendi vererõhku, hingamise sagedust ja uriini eritust.

Muud ravimid ja magneesiumsulfaat

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Magneesiumsulfaadil ei ole tuvastatud väga tõsiseid koostoimeid teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ei ole teada, et magneesiumsulfaadi lühiajaline kasutamise raseduse ajal avaldaks kahjulikku toimet loote arendule.

Kuid magneesiumsulfaadi kasutamine suurtes annustes raseduse kolmandal trimestril võib põhjustada hingamise pärssumist vastsündinul.

Ei ole teada, et magneesiumsulfaadi kasutamine lühiajaliselt imetamise ajal mõjutaks rinnapiima saavat last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimit kasutatakse haiglatingimustes.

3. Kuidas magneesiumsulfaati manustada

Ravimi täpne annuse määrab raviarst sõltuvalt patsiendi seisundist ja muudest individuaalsetest iseärasusest. Soovitav on enne magneesiumi manustamist mõõta magneesiumi sisaldust patsiendi plasmas ja määrata ravimi täpne annus ja manustamise sagedus sõltuvalt magneesiumi tasemest patsiendi organismis.

Neerupuudulikkuse korral kasutada tavapärasest väiksemaid annuseid.

Tavapärane annus on 8 ml 25% magneesiumsulfaadilahust manustatuna (e 2 g magneesium sulfaati) 10-15 minuti jooksul veeni.

Vajadusel võib annust ühe korra korrata.

Ravimit tuleb manustada kogemustega tervishoiutöötaja järelevalve all.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Magneesiumsulfaat põhjustab kõrvaltoimeid enamasti üleannustamise korral. Magneesiumsülaadi üleannustamise sümptomid on järgmised: iiveldus, oksendamine, janu, naha õhetamine, vererõhulangus, südame rütmihäired, uimasus, segasus, lihaskrambid ja kõõlusreflekside nõrgenemine, väga raske üleannustamise korral kooma ja hingamise pärssumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas magneesiumsulfaati säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Muu teave

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.