

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tramadol Lannacher 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid tramadool (*Tramadolum*)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Tramadol Lannacher ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Tramadol Lannacher'i võtmist
3. Kuidas Tramadol Lannacher'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Tramadol Lannacher'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Tramadol Lannacher ja milleks seda kasutatakse

Tramadol Lannacher'i toimeaine on tramadool, mis on opioidide klassi kuuluv valuvaigisti. Ravim mõjutab kesknärvisüsteemi (pea- ja seljaaju närvirakud) ja on tugevatoimeline valuvaigisti.

Tramadol Lannacher'i kasutatakse mõõduka ja tugeva valu raviks.

2. Mida on vaja teada enne Tramadol Lannacher'i võtmist

Tramadol Lannacher'i ei tohi võtta

- kui olete tramadooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui te olete hiljuti tarbinud alkoholi või võtnud unerohu, teisi tugevatoimelisi valuvaigisteid, ravimeid, mida kasutatakse psüühiliste haiguste ravis, või teisi kesknärvisüsteemi mõjutavaid ravimeid;
- kui te võtate MAO inhibiitoreid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid) või kui te olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul enne ravi alustamist Tramadol Lannacher'iga (vt „Muud ravimid ja Tramadol Lannacher“);
- kui teil on epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile;
- asendusravina ärajätunähtude korral.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tramadol Lannacher'i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Eriline ettevaatus on vajalik, kui

- te arvate, et teil on teiste valuvaigistite (opioidid) suhtes tekkinud sõltuvus või teil on alkoholisõltuvus; sel juhul peab ravi olema võimalikult lühiaegne, arst kontrollib teie seisundit regulaarselt;
- teil on teadvusehäireid (teile tundub, et hakkate kohe minestama);
- teil on šokk vigastuse või verekaotuse tagajärjel (selle tunnuseks võib olla külm higi);
- teil on koljusisene rõhk suurenenud (see on võimalik pärast pea traumad või ajuhaiguste korral);
- teil on hingamisraskused;

- kui teil on kalduvus epilepsiale või krampidele, sest krambirisk võib ravi ajal suurenedada; Tramadol Lannacher võib suurendada krambihoogude riski ka patsientidel, kes manustavad teisi krambiläve langetavaid ravimeid (vt „Muud ravimid ja Tramadol Lannacher“);
- kui teil on maksa- või neeruhaigus;
- kui te olete allergiline tugevatoimeliste valuvaigistite (opioiidide) suhtes;
- kui teil on depressioon ja te kasutate antidepressante, sest neil võib olla koostoime tramadooliga (vt lõik „Muud ravimid ja Tramadol Lannacher“).

Teavitage oma arsti, kui mõni ülalloetletud probleemidest kehtib teie kohta, tekib ravi ajal Tramadol Lannacher'iga või on kunagi varem tekkinud.

Uneaegsed hingamishäired

Tramadol Lannacher võib põhjustada unaegseid hingamishäireid, kaasa arvatud tsentraalne uneapnoe (pindmine hingamine või hingamispeetus magamise ajal) ja unaegne hüpokseemia (madal hapnikusisaldus veres). Sümptomid võivad muuhulgas olla hingamispausid une ajal, öine ärkamine õhupuuduse tõttu, magamisraskus või liigne unisus päeval. Kui täheldate ise või keegi teine täheldab teil neid sümptomeid, pöörduge arstile. Arst võib vähendada ravimi annust.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil tekivad ravi ajal Tramadol Lannacher'iga äärmine väsimus, söögiisu puudus, tugev kõhuvalu, iiveldus, oksendamine või madal vererõhk. Need võivad olla neerupealiste puudulikkuse ilmingud (hormooni kortisool vaegus). Arst võib määrata teile hormoonasendusravi.

Soovitavas annuses tramadooli manustavatel patsientidel on teatatud epileptilistest hoogudest. Risk võib suurenedada, kui tramadooli annused ületavad maksimaalset soovituslikku annust ööpäevas (400 mg). Krambiläve langetavate ravimitega koosmanustamisel võib krambihoogude risk suurenedada.

Pidage meeles, et Tramadol Lannacher võib tekitada psüühilist ja füüsilist sõltuvust. Pikaajalisel kasutamisel võib Tramadol Lannacher'i toime nõrgeneda, mistõttu ravimit tuleb manustada suuremas annuses. Seetõttu tuleb ravimsõltumusele või ravimite kuritarvitamisele kalduvaid patsiente ravida Tramadol Lannacher'iga ainult lühiajaliselt ja range arstliku järelevalve all.

Kui te lõpetate Tramadol Lannacher'i manustamise, eriti pärast pikaajalist ravi, soovitab arst ärajätunähtude vältimiseks annust vähendada järk-järgult.

Tramadooli ainevahetus toimub maksas teatud ensüümi toimetel. See ensüüm võib erinevatel inimestel olla erineva aktiivsusega, mis võib mõjutada inimesi erinevalt. Osal inimestest ei pruugi ravim seetõttu piisavalt valu leevendada, kuid teistel tekivad suurema tõenäosusega rasked kõrvalnähud. Lõpetage selle ravimi võtmine ja pöörduge kohe arstile, kui täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest: aeglane või pindmine hingamine, segasusseisund, unisus, pupillide ahenemine, iiveldus või oksendamine, kõhukinnisus, söögiisu kaotus.

On väike tõenäosus, et teil võib tekkida serotoniinisündroom, kui te kasutate tramadooli üksikravimina või samaaegselt koos teatud antidepressantidega. Kui teil tekivad selle tõsise seisundi sümptomid, pöörduge viivitamatult arstile (vt lõik 4, „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Lapsed ja noorukid

Tramadol Lannacher ei sobi kasutamiseks lastel vanuses kuni 12 aastat.

Kasutamine hingamisprobleemidega lastel

Tramadooli ei soovitata kasutada hingamisprobleemidega lastel, sest neil võivad tramadooli mürgistuse sümptomid olla tõsisemad.

Muud ravimid ja Tramadol Lannacher

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Tramadol Lannacher'i ei tohi võtta koos MAO-inhibiitoritega (teatud tüüpi depressiooniravimid).

Tramadol Lannacher'i valuvaigistav toime võib nõrgeneda ja toimeaeg lüheneda, kui te võtate lisaks ravimeid, mis sisaldavad:

- karbamasepiini (epileptiliste krampide ravim),
- ondansetrooni (iiveldusevastane ravim),
- fluoksetiini, paroksetiini (depressiooni ravimid),

samuti võivad need suurendada krambihoogude tekkeriski (vt allpool).

Tramadol Lannacher'i ja rahustite, nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid, samaaegne kasutamine suurendab uimasuse, hingamisraskuste (hingamisdepressioon), kooma tekkeriski ning võib olla eluohtlik. Seetõttu tuleb samaaegset kasutamist kaaluda vaid siis, kui puuduvad teised ravivõimalused.

Kui teie arst siiski määrab teile Tramadol Lannacher'i samaaegselt koos rahustitega, peab ta piirama annust ja kasutamise kestust.

Teatage oma arstile kõigist rahustitest, mida te võtate ja järgige hoolikalt arsti ettekirjutusi annuse osas. On abiks, kui teavitate oma sõpru või lähedasi ülalmainitud nähtudest ja sümptomitest. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekivad sellised sümptomid.

Teie arst otsustab, kas te tohite Tramadol Lannacher'i võtta ja mis annuses.

Kõrvaltoimete risk on suurem, kui te kasutate samal ajal Tramadol Lannacheriga järgmisi ravimeid:

- teised valuvaigistid, nt morfiin ja kodeiin (võib sisalduda ka kõharohtudes) ja alkohol; sel juhul võite olla uimane või tunda, et hakkate minestama; kui see juhtub, rääkige arstile;
- ravimid, mis võivad põhjustada krampide teket, nt teatud antidepressandid või antipsühhootikumid; samaaegsel ravil Tramadol Lannacher'iga võib suurendada krambitekke oht; arst otsustab, kas Tramadol Lannacher on teile sobiv ravim;
- teatud tüüpi antidepressandid; Tramadol Lannacher'il võib olla koostoime nende ravimitega ja teil võib tekkida serotoniinisündroom (vt lõik 4, „Võimalikud kõrvaltoimed“);
- kesknärvisüsteemi mõjutavad ravimid, nt unerohud, rahustid ja teised aju mõjutavad ravimid;
- verehüübimist pärssivaid ravimid, mis sisaldavad kumariini või kumariini derivaate (nt varfariin); nende ravimite toime võib muutuda ja võib tekkida veritsus;
- karbamasepiini sisaldavaid ravimid, mida kasutatakse epilepsia ravis; need võivad vähendada valuvaigistavat toimet;
- ketokonasooli (seeninfektsioonivastane ravim) või erütromütsiini (antibiootikum) sisaldavad ravimid;
- tsentraalselt toimivad valuvaigistid (nt buprenorfiin, nalbufiin, pentatsotsiin); samaaegne ravi Tramadol Lannacher'iga ei ole soovitatav, sest valuvaigistav toime võib nõrgeneda;
- naltreksooni sisaldavad ravimid;
- ondansetrooni sisaldavaid ravimeid (operatsioonijärgse iivelduse raviks); Tramadol Lannacher'i annust võib olla vaja suurendada.

Tramadol Lannacher koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toit ei mõjuta Tramadol Lannacher'i toimet.

Ravi ajal Tramadol Lannacher'iga ei tohi tarbida alkoholi, sest ravimi kõrvaltoimed võivad lisanduda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Tramadol Lannacher'i kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Tramadol Lannacher'i ei tohi raseduse ajal kasutada. Pikaajaline ravi raseduse ajal võib põhjustada võõrutusnähtude teket vastsündinul.

Imetamine

Tramadool eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi te imetamise ajal Tramadol Lannacher'i kasutada rohkem kui ühe korra. Kui te kasutate Tramadol Lannacheri rohkem kui ühe korra, peate imetamise lõpetama.

Viljakus

Inimuuringute andmetel ei mõjuta tramadool tõenäoliselt naiste või meeste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tramadool Lannacher võib põhjustada uimasust ja pööratustunnet ning ähmast nägemist, mistõttu võib teie reaktsioonikiirus aeglustuda. Seda on eriti oodata ravi alguses, annuse muutmisel ja kasutamisel koos alkoholiga või teiste ravimitega, millel on kesknärvisüsteemi pärssiv toime. Kui te tunnete, et teie reaktsioonikiirus on muutunud, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Tramadool Lannacher sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi, st põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Tramadol Lannacher'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb alla neelata tervelt ja katki närimata koos piisava vedeliku kogusega, koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Tramadool Lannacher'i manustatakse ainult nii kaua, kui see on näidustatud. Pikaajalise valuvastase ravi korral Tramadol Lannacher'iga hindab teie arst selle jätkamise vajalikkust ja raviannust regulaarselt (vajadusel koos ravipausidega).

Annus

Annust kohandatakse vastavalt teie valu intensiivsusele ja individuaalsele tundlikkusele. Üldjuhul tuleb kasutada väikseimat valuvaigistavat annust. Ärge võtke rohkem kui 400 mg tramadooli ööpäevas, välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Annustamissoovitused on järgmised, kui arst ei ole määranud teisiti.

Täiskasvanud ja noorukid alates vanusest 12 aastat

Üks 50 mg õhukese polümeerikattega tablett iga 4...6 tunni järel.

Mõõduka valu korral manustatakse Tramadol Lannacher 50 mg õhukese polümeerikattega tablett ühekordse annusena. Kui valu ei leevendu piisavalt 30...60 minuti jooksul, võib võtta teise 50 mg tableti. Tugeva valu korral võib manustada 100 mg tramadooli (2 Tramadol Lannacher 50 mg tabletti) ühekordse annusena.

Vajadusel võib arst teile määrata teistsuguse, sobivama tugevusega Tramadol Lannacher'i.

Ärge muutke iseseisvalt annust. Kui teil on tunne, et Tramadol Lannacher'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga.

Eakad

Eakatel patsientidel (üle 75 aasta) võib eritumine aeglustuda. Kui see kehtib teie kohta, võib arst soovitada manustada ravimit harvem.

Raske maksa- või neeruhaigus (puudulikkus)/dialüüsi saavad patsiendid

Raske maksa- ja/või neerupuudulikkusega patsiendid ei tohi Tramadol Lannacher'i võtta. Kui teil on kerge või mõõdukas maksa ja/või neerupuudulikkus, võib arst soovitada manustada ravimit harvem.

Lapsed vanuses kuni 12 aastat

Lastele vanuses kuni 12 aastat ei tohi Tramadol Lannacher 50 mg tablette manustada. Laste raviks on saadaval Tramadol Lannacher suukaudne lahus või süstelahus.

Kui te võtate Tramadol Lannacher'i rohkem, kui ette nähtud

Kui olete kogemata võtnud lisaannuse, ei ole sel üldjuhul negatiivset mõju. Võtke järgmine annus nii, nagu arst on määranud.

Kui te võtate palju Tramadol Lannacher'i tablette korraga, võivad tekkida ägeda üleannustamise sümptomid: tugevalt ahenenud pupillid, iiveldus või oksendamine, vererõhu langus, südame löögisageduse tõus, minestamine, kollaps, teadvusehäire kuni koomani (teadvusetus), krambid, hingamisraskus kuni hingamise seiskumiseni.

Mis tahes nimetatud nähtude tekkimisel, võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Tramadol Lannacher'i võtta

Kui te unustate tabletti võtta, siis võib valu tõenäoliselt naasta. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tablettide võtmisega, nagu tavaliselt. Kui aeg järgmise tableti võtmiseks on lähedal, ärge võtke unustatud annust ja manustage järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Tramadol Lannacher'i võtmise

Kui te katkestate või lõpetate ravi Tramadol Lannacher'iga liiga vara, tuleb valu tõenäoliselt tagasi. Kui te soovite lõpetada ravi ebameeldivate kõrvaltoimete tõttu, pidage nõu arstiga.

Te ei tohi selle ravimi manustamist järsku lõpetada, kui arst ei ole nii määranud. Kui soovite ravimi võtmise lõpetada, arutage seda kõigepealt oma arstiga, eriti kui olete ravimit manustanud pikka aega. Teie arst annab teile nõu, millal ja kuidas lõpetada, seda võib olla vajalik teha järk-järgult annust langetades, et vähendada tarbetute kõrvaltoimete (ärajätunähtude) tekke võimalust.

Üldiselt ei põhjusta ravi lõpetamine tramadooliga kõrvaltoimeid. Tramadol Lannacher'iga ravitud inimesed on ravi järsul katkestamisel siiski harva tundnud end mõnda aega halvasti. Võivad tekkida erutus, ängistus, närvilisus või värinad. Patsiendid võivad olla üliaktiivsed, magamisraskustega ja kogeda kõhu- või soolehäireid. Väga vähestel võivad tekkida paanikahood, hallutsinatsioonid, ebatavalised tajud nagu sügelemine, kipitus ja tuimus ning kuulmisaistingud (kõrvade vilistamine või kohin ehk *tinnitus*). Väga harva on tekkinud muid ebatavalisi kesknärvisüsteemi nähte, näiteks segasusseisund, meelepetted, enda isiksuse tajumise häired (depersonalisatsioon) ja reaalsustaju häired (derealisatsioon) ning sundmõtted tagakiusamisest (paranoia). Kui te kogete mõnda nimetatud toimetest pärast ravi lõpetamist, pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Võtke kohe ühendust oma arstiga kui teil tekib mõni allergilise reaktsiooni sümptom: näo, keele ja (või) kõri turse, neelamisraskus või nõgestõbi koos hingamisraskusega.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed ravi ajal Tramadol Lannacher'iga on iiveldus ja pööritustunne, mis võivad tekkida enam kui 1 patsiendil 10-st.

Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed.

Väga sage (võib tekkida enam kui 1 kasutajal 10-st):

– pööritustunne;

- iiveldus.

Sage (võib tekkida 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

- peavalu, unisus;
- oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus;
- higistamine;
- väsimus.

Aeg-ajalt (võib tekkida 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

- mõju südamele (südamepekslemine, kiire südamegevus), mis võib eriti ilmneda püstiasendis või füüsilise koormuse korral;
- mõju südame ja veresoonte regulatsioonile (vererõhu langus istuvast või lamavast asendist püsti tõustes, mis põhjustab pööratud tunnet või minestust), pööratud tunne koos nõrga pulsiga, kahvatus, huulte ja küünte sinine värvus;
- öökimine, seedetrakti ärritusnähud (survetunne maos, kõhupuhitus), kõhulahtisus;
- nahareaktsioonid (sügelus, lööve, nõgestõbi).

Harv (võib tekkida 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

- allergilised reaktsioonid (näiteks hingamisraskus, vilisev hingamine, nahaturse) ja šokk (äkiline vereringehäire);
- söögiisu muutused;
- hallutsinatsioonid, segasusseisund, unehäired, deliirium, ärevus ja õudusunenäod;
- Tramadol Lannacher'i manustamise järgselt võivad tekkida psühholoogilised kaebused, mille intensiivsus ja olemus võivad varieeruda (sõltuvalt isiksusest ja ravi kestusest). Need võivad olla meeleolu muutused (tavaliselt heatujulisus, vahel pahurus), aktiivsuse muutused (tavaliselt vähenenud, aeg-ajalt suurenenud); otsustusvõime ja taju häired, mis võivad viia valeotsusteni,
- tundlikkushäired (näiteks sügelus, kipitus, tuimus), värisemine, krambid, tahtmatud lihastõmbelused, koordinatsioonihäired, minestamine, kõnehäired; epileptilised krambid on tekkinud peamiselt tramadooli suurte annuste korral või kui tramadooliga samaaegselt manustati teisi ravimeid, mis võivad krampe esile kutsuda;
- nägemishäired (ähmane nägemine, pupillide liigne laienemine või ahenemine);
- südame löögisageduse aeglustumine;
- vererõhu tõus;
- hingamishäired (aeglane hingamine, õhupuudus);
- lihasnõrkus;
- urineerimishäired (raskendatud urineerimine ja uriinipeetus).

Väga harv (võib tekkida kuni 1 kasutajal 10 000-st):

- maksatalitluse laboratoorsete näitajate tõus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata):

- veresuhkru sisalduse vähenemine (hüpoglükeemia);
- luksumine;
- on täheldatud astma ägenemist, ehkki otsest seost ei ole leitud;
- serotoniinisündroom, mis võib avalduda vaimse seisundi muutustena (nt rahutus, hallutsinatsioonid, kooma) ning palaviku, südame löögisageduse kiirenemise, vererõhu kõikumiste, tahtmatute tõmbeluste, lihasjäikuse, koordinatsioonihäirete ja/või seedetrakti sümptomitena (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus); vt lõik 2, „Mida on vaja teada enne Tramadol Lannacher'i võtmist“.

Ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda võõrutusnähud (vt „Kui te lõpetate Tramadol Lannacher'i võtmise“).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Tramadol Lannacher'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tramadol Lannacher sisaldab

- Toimeaine on tramadoolvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg tramadoolvesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on
Tableti sisu: kroskarmelloosnaatrium, veevaba ränikolloid, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, magneesiumsteraat.
Tableti kate: makrogool 6000, hüpromelloos 5, talk, titaandioksiid, polüakrülaatdispersioon 30%.

Kuidas Tramadol Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümarad, kaksikkumerad tabletid ilma poolitusjooneta.
Pakendis 20 või 1000 tabletti.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloo hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ
Lõõtsa 8, Tallinn, 11415
Tel: 6600945

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2021.

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele

Üleannustamine

Sümptomid

Tramadooli üleannustamishäired on enamasti samad, mis teistel tsentraalse toimega analgeetikumidel (opioididel). Tekkida võivad mioos, oksendamine, kardiovaskulaarne kollaps, teadvusehäired kuni koomani, krampid ja hingamisdepressioon kuni hingamisseiskuseni.

Ravi

Rakendada üldiseid esmaabi võtteid. Hoida hingamisteed avatuna (aspiratsioonioht), säilitada hingamine ja vereringe sõltuvalt sümptomitest. Hingamisdepressiooni antidoot on naloksoon. Loomkatsetes ei olnud naloksoonil toimet krampidele. Sellistel juhtudel peab manustama intravenoosselt diasepaami.

Mürgistuse korral suukaudsete ravimvormidega on seedetrakti puhastamine aktiivsõega või maoloputus soovitatav kuni 2 tunni jooksul pärast tramadooli manustamist. Hilisem seedetrakti puhastamine võib olla kasulik erakordselt suurte koguste või prolungeeritult vabanevate ravimvormide manustamisel.

Tramadool on hemodialüüsi või hemofiltratsiooni teel seerumist minimaalselt eemaldatav. Seetõttu ei saa tramadooli ägeda mürgistuse raviks kasutada hemodialüüsi või hemofiltratsiooni.