

# Kvaliteediindikaatorid

## ÄGE KÕHT

### A. Tüüpkäsitlus

#### Anamnees:

- kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas, kas miski on valu leevendanud
- kaasuvad sümptomid: iiveldus-oksendamise; gaaside peetus, kõrvetised, düsuurilised vaevused, kõhulahtisus, palavik, verine roe, kõhnumine
- fertiilses eas naistel raseduse võimalus
- varasemad kõhuprobleemid, operatsioonid, tarvitavad ravimid

#### Objektiivne leid:

- üldseisund:
  - teadvusseisund, südamesagedus, vererõhk, hingamissagedus, SpO<sub>2</sub>
  - naha värvus (kahvatu, ikteeriline, marmoraaž jms), limaskestade kuivus jt. dehüdratatsiooni nähud
  - kehatemperatuur
- kõhu objektiivne leid:
  - kõhukatete pinge, positiivsed peritoneaalärritusnähud
  - sooleperistaltika kõhu esilevõlvumine
  - täitunud põis
  - rasedus
  - palpeeritav tuumor
  - pulseeriv mass
  - meteorism
  - vajadusel rektaalne uuring: meleena
- muu:
  - ülakõhuvalu puhul EKG müokardi infarkti välistamiseks
  - veresuhkru väärtus välistamiseks diabeeti
  - kopsude auskultatsioon välistamiseks pneumooniat

#### Käsitlus:

- veenikanüül ning infusioonravi 0,9% NaCl-ga, hüpotensiooni korral ka kolloid
- kardiomonitoring
- hapnikravi kui SpO<sub>2</sub><95%
- valuvaigisti ja/või spasmolüütikumi manustamine vastavalt valu iseloomule ning tugevusele
- kõrge palaviku langetamine
- vajadusel antiemeetiline ravi

## Transport:

- ägeda kõhu diagnoosiga patsient tuleb hospitaliseerida kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valvega haiglasse!
- haiglat tuleb informeerida patsiendi seisundist ning saabumise ajast.

## B. Indikaatorid

### Anamnees

- Kas on kirjeldatud kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas?
- Kas fertiilses eas naist on küsitletud võimaliku raseduse kohta?
- Kas on loetletud kaasuvad sümptomid: iiveldus-oksendamise; gaaside peetus, kõrvetised, düsuurilised vaevused, kõhulahtisus, palavik, verine roe, kõhnumine?
- Kas on teada varasemad operatsioonid?

### Objektiivne leid:

- Kas on hinnatud patsiendi üldseisund?
  - teadvusseisund, südamesagedus, vererõhk, hingamissagedus, SpO<sub>2</sub>
  - naha värvus (kahvatu, ikteeriline, marmoraaž jms), dehüdratatsiooni tunnused
  - kehatemperatuur
- Kas on hinnatud kõhu objektiivne leid:
  - Kas on hinnatud kõhukatete pinget, peritoneaalärritusnähte?
  - Kas on auskulteeritud sooleperistaltikat? Kas esineb kõhu esilevõlvumist?
    - täitunud põis
    - rasedus
    - palpeeritav tuumor
    - pulseeriv mass
    - meteorism
  - Kas vajadusel on patisenti uuritud rektaalselt?
- Kas on mõeldud ka muudele ägeda kõhu põhjustele?
  - Kas ülakõhuvalu puhul on tehtud EKG müokardi infarkti välistamiseks?
  - Kas on kontrollitud veresuhkru väärtust välistamiseks diabeeti?
  - Kas on auskulteeritud kopse välistamiseks hingamisorganite patoloogiat?

### Käsitlus:

- Kas patsiendile on asetatud veenikanüül ning rakendatud infusioonravi 0,9% NaCl-ga, hüpotensiooni korral ka kolloidiga?
- Kas patsient on kardiomonitoritud?
- Kas patsiendile on rakendatud hapnikravi kui SpO<sub>2</sub><95%?
- Kas patsiendile on manustatud valuvaigistit ja/või spasmolüütikumi vastavalt valu iseloomule ning tugevusele?
- Kas kõrge palaviku vastu on manustatud ravimit? Kas patsient on vajadusel saanud antiemeetilist ravi?

## **Transport:**

- Kas ägeda kõhu diagnoosiga patsient on esmaselt hospitaliseeritud kirurgi ning operatsioonitoa ööpäevaringse valveta haiglasse?
- Kas haiglat on patsiendi seisundist ning saabumise ajast teavitatud?

Haiglaravi